



開け口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

抗炎症成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、肩こり、筋肉痛に効果を発揮します。

ノニル酸ワニリルアミドの局所温感刺激作用により、血行不良を改善し、肩こり、腰痛を改善します。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

ⓘ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤が衣類や寝具等に付着し、濡れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水性
エタノール含有物

外用鎮痛消炎薬

販売名：サンツールGL液

第3類医薬品 内容量
100mL

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

お問い合わせ先

株式会社 富士薬品(学術室)

☎048-648-1118

9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志1丁目丸橋1229番地

発売元：株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

痛みにサツと塗れる

サンツール[®]
GL液肩こり・腰痛
筋肉痛

セルフメディケーション

税 控除 対象

[液剤] 100mL

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

効能・効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量をお守りください。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 - (4) 外用にのみ使用してください。
 - (5) 入浴する1時間前からは使用しないでください。また、薬剤が肌に残っている場合、入浴時や汗をかいた時には、強い刺激を感じる場合があります。
 - (6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
 - (7) 皮膚の弱い方は、同じ所に続けて塗布しないでください。
 - (8) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けてください。
 - (9) 使用後は手を洗ってください。
- ※ 塗布部に肌を当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

成分・分量 <100g中>

サリチル酸グリコール	10.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.025g
クロルフェニルミナリン酸塩	0.1g
l-メントール	2.0g

添加物：マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、エタノール 含有



4 987524 105014