

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

外用鎮痛
消炎薬 テープ 14枚

第2類医薬品

01

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

肩の痛み
腰痛
筋肉痛
関節痛


外用鎮痛
消炎薬 テープ 14枚
第2類医薬品

肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

鎮痛力 ジクロフェナク
ナトリウム配合
+
L-メントール

全方向伸縮
タイプ



[テープ] 14枚入(7枚入×2袋)
1枚サイズ 7cm×10cm

富士薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

肩の痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛

外用鎮痛
消炎薬 テープ 14枚

第2類医薬品

ここを押して
開けてください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

サンツール®DFテープα (外用鎮痛消炎薬) 第2類医薬品 [1枚:7cm×10cm] 14枚入

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- 1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児
- 2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
- 4. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 他の医薬品を使用している人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人 (5) 次の診断を受けた人 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ (6) 次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキセド、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (7) 高齢者
- 2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がりますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、発熱(らくせつ)(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着
症状の名称	症状
シヨップ(アナイラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 1回あたり、24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

成分・分量 <膏体100g中>

ジクロフェナクナトリウム	2.0g
L-メントール	3.5g
添加物: イソステアリン酸、BHT、ステレン・イソブレン・ステレンブロックコポリマー、テルペン樹脂、スクワラン、流動パラフィン 含有	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを開けて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸丸1229番地

発売元: 株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



副作用被害救済制度
☎0120-149-931



商品詳細へ

使用期限

製造番号