

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

商品詳細へ



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむしたむし等又は化膿している患部
- (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等
- 2. 顔面には、広範囲に使用しないこと
- 3. 長期連用しないこと

📖相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむしたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

第②類医薬品

販売名：
フジアローHD液
(鎮痒消炎薬)
内容量 30mL

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 次の物には付着させないこと(変質又は変色する場合がある)床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用すること
- (7) 染めた髪につくと色落ちすることがある

火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ
水溶性 エタノール含有物 30mL



フジアローHD液

⇨ここから開けてください

第②類医薬品

かゆい部分にピンポイント使用

フジアロー

HD液

皮膚用薬 液剤 30mL

塗りやすい
ピンポイント
容器



頭皮のかゆみ・湿疹に 汗ゃヘア剤によるかゆみに

9つの有効成分が効く

アンデラッグステロイド(PVA)配合
(患部ではよく効き、体内では低活性化)



富士薬品

セルフメディケーション
税控除対象

30mL

第②類医薬品

使用期限

製造番号



4 987524 104727


効能・効果

かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜容器の使用方法＞



- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。
(暑い時期には内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです)
- 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。
(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります)

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 <100mL中>

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)0.15g、グリチルレチン酸0.2g、リドカイン2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0g、クロタミン5.0g、サリチル酸グリコール1.0g、イソプロピルメチルフェノール0.5g、アラントイン0.2g、l-メントール3.5g

添加物：プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、乳酸、乳酸Na、ジブチルヒドロキシルエン、ヒプロメロース、エタノール 含有

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
9:00~17:30(土、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元
株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地