



第2類医薬品

特徴

- ヘパリン類似物質0.3%配合
保湿作用・抗炎症作用・血行促進作用があります。
- 油性クリーム(W/O型)
肌にしっかり密着し、外部の刺激から患部を守ります。
- 赤ちゃんから使えます。
- 無香料・無着色、ステロイドフリー、
エタノールフリー。



肌には本来バリア機能があり、水分の蒸発や外部からの刺激をブロックし、からだを守っています。一方、皮膚が乾燥した状態(バリア機能が低下した状態)になると、水分が逃げやすく、外部からの刺激に弱い状態になってしまいます。フジアローHPクリームは、肌本来のバリア機能を高め、肌の潤いを取り戻します。

- ※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)
- ※顔面のきず・やけどのあとには使用しないでください。
- ※かさぶたには使用しないでください。

発売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町横越16番1

第2類医薬品

フジアローHPクリーム

ご使用に際して、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
 - 目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

手指などの気になる乾燥に

フジアロー[®] HPクリーム

乾燥肌の 保湿・改善に

ヘパリン類似物質配合

血行促進、保湿作用
非ステロイド剤

しっかり密着
油性クリーム



効能・効果

手指の荒れ、ひび・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚病、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのびして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 <100g中>

ヘパリン類似物質 0.3g

添加物:ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ジメチルポリシロキサン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、硫酸マグネシウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、精製水

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

60g

富士薬品

第2類医薬品



4 987524 105717