

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

湿疹・皮膚炎・かぶれ

# フジアロー<sup>®</sup>V軟膏

〈軟膏〉

## ⚠️使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部  
(2) 目、目の周囲
3. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 患部が広範囲の人  
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺 激感、白くなる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん


## 用法・用量

1日1回～数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤を塗布後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7) 化粧下、ひげそり後などに使用しないでください。

### お薬の塗り方



患部にお薬を乗せ、患部を覆うようにやさしく伸ばします。 ※擦り込まないこと  
●表面がベタつくくらいが適切です

## 成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12g	副腎皮質ホルモンの一つで、皮膚のかゆみや炎症を抑えます。

添加物：流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、白色ワセリン 含有

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)

電話 048-648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

発売元 **株式会社 富士薬品**

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越16番1